

جدول نسبت خوراک به وزن مرغ گوشتی (۱۰/۰۰۰ قطعه)

سن (روز)	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	وزن مناسب پایان هفته گرم
هفته اول	مصرف خوراک روزانه (کیلوگرم)	۱۳۰	۱۵۵	۱۹۰	۲۱۵	۲۴۰	۲۷۰	۳۰۰
	مصرف آب روزانه (لیتر)	۲۶۰	۳۱۰	۳۸۰	۴۳۰	۴۸۰	۵۴۰	۶۰۰
وزن گله فعلی:								
هفته دوم	سن (روز)	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
	مصرف خوراک روزانه (کیلوگرم)	۳۳۰	۳۶۰	۳۸۰	۴۰۰	۴۴۵	۴۹۰	۵۲۰
	مصرف آب روزانه (لیتر)			۷۶۰	۸۰۰	۸۹۰	۹۸۰	۱۰۴۰
وزن گله فعلی:								
هفته سوم	سن (روز)	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱
	مصرف خوراک روزانه (کیلوگرم)	۵۶۵	۶۰۵	۶۴۰	۶۸۵	۷۲۵	۷۶۰	۸۰۰
	مصرف آب روزانه (لیتر)	۱۱۳۰	۱۲۱۰	۱۲۸۰	۱۳۷۰	۱۴۵۰	۱۵۲۰	۱۶۰۰
وزن گله فعلی:								
هفته چهارم	سن (روز)	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸
	مصرف خوراک روزانه (کیلوگرم)	۸۳۵	۸۸۰	۹۲۰	۹۶۰	۹۹۰	۱۰۱۵	۱۰۵۵
	مصرف آب روزانه (لیتر)	۱۶۷۰	۱۷۶۰	۱۸۴۰	۱۹۲۰	۱۹۸۰	۲۰۳۰	۲۱۱۰
وزن گله فعلی:								
هفته پنجم	سن (روز)	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵
	مصرف خوراک روزانه (کیلوگرم)	۱۱۰۰	۱۱۵۵	۱۱۹۰	۱۲۳۵	۱۲۷۵	۱۳۳۵	۱۳۹۰
	مصرف آب روزانه (لیتر)	۲۲۰۰	۲۳۱۰	۲۳۸۰	۲۴۷۰	۲۵۵۰	۲۶۷۰	۲۷۸۰
وزن گله فعلی:								
هفته ششم	سن (روز)	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲
	مصرف خوراک روزانه (کیلوگرم)	۱۴۳۵	۱۵۰۰	۱۵۶۵	۱۶۲۰	۱۶۵۰	۱۶۷۰	۱۷۱۰
	مصرف آب روزانه (لیتر)	۲۸۷۰	۳۰۰۰	۳۱۳۰	۳۲۴۰	۳۳۰۰	۳۳۴۰	۳۴۲۰
وزن گله فعلی:								
هفته هفتم	سن (روز)	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹
	مصرف خوراک روزانه (کیلوگرم)	۱۷۷۵	۱۸۱۵	۱۸۵۵	۱۸۹۵	۱۹۲۵	۱۹۷۰	۲۰۱۰
	مصرف آب روزانه (لیتر)	۳۵۵۰	۳۶۳۰	۳۷۱۰	۳۷۹۰	۳۸۵۰	۳۹۴۰	۴۰۲۰
وزن گله فعلی:								

اطلاعات مندرج در جدول، میانگین ۵ ساله در سراسر ایران می باشد.

اطلاعات مندرج در جدول بر اساس جوجه یک روزه به وزن ۴۱ گرم می باشد.

در بدو ورود جوجه حداقل یک کارتن جوجه وزن کشی و با اطلاعات کارت جوجه مقایسه گردد.

میزان مصرف خوراک و آب ذکر شده، مربوط به زمانی است که گله در استرس گرمایی و یا سرمای می باشد.

جهت محاسبه میانگین وزن گله به فاصله هر ۷ روز، حداقل ۱۰ قطعه جوجه ریز و درشت وزن کشی گردد.

